


5

Bagaimana cara mencegah penularan TB ?



Penderita TB harus menutup mulutnya sewaktu batuk dan bersin



Tidak meludah di sembarang tempat, tapi membuang pada tempat khusus dan tertutup seperti kaleng, wadah bekas atau ke lubang WC dan disiram



Menjemur Alas Tidur agar Tidak Lembab



Rumah tinggal harus mempunyai ventilasi udara yang baik agar sirkulasi udara berjalan lancar



Imunisasi BCG untuk anak usia di bawah 5 tahun

Berobat Tuntas Sembuh Tuntas

6

Perilaku Hidup Sehat



Makan teratur dengan menu seimbang serta cukup sayur dan buah



Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hidup



Berolahraga dengan Benar cukup dan teratur



Beristirahat cukup dan teratur



Tidak merokok



Segera berobat jika sakit

Segera Periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat jika anda mempunyai gejala TB atau menemukan orang dengan gejala-gejala TB !!

MEDIA SOSIAL



www.rsstrokebkt.com



humasrsomh



humasrssnbkt



@bukittinggirsn



RS. OTAK DR. Drs. M.HATTA BUKITTINGGI



Sehatpedia



Berita Yankes



Pengaduan Masyarakat (DUMAS) 0822-8420-2324



**RUMAH SAKIT OTAK
DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**



Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi
Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431
Email : rsomh.bkt20@gmail.com / rssnyanmed@yahoo.co.id


Tuberkulosis (TB) Bisa Disembuhkan



**PROMOSI KESEHATAN
RSOMH BUKITTINGGI**

NAMA PASIEN :
UMUR :
NO. MR :
TEMPAT RAWAT :
PETUGAS :

1 Tentang Gejala Tuberkulosis (TB)



Mycobacterium
Tuberculosis
Terhirup

Penyakit menular
yang diakibatkan
kuman TB
(Mycobacterium
tuberculosis)

TB

Bukan penyakit keturunan,
penyakit kutukan atau
dikarenakan guna-guna
atau santet

Dapat menyerang
seluruh tubuh
terutama
paru-paru

2 Gejala TB

GEJALA
UTAMA

Batuk Berdahak
Terus Menerus
Lebih dari 2 Minggu



3 Cara Mengobati TB

TB dapat disembuhkan



Setelah dinyatakan sakit TB, pasien diberi obat yang harus diminum secara teratur sampai tuntas selama 6 - 8 bulan. Pasien akan didampingi oleh Petugas Menelan Obat (PMO) selama proses pengobatan.

Selama masa pengobatan diperlukan pemeriksaan dahak pada:

- * Akhir tahap awal (intensif) pengobatan sesudah 2-3 bulan
- * 1 (satu) bulan sebelum masa pengobatan berakhir
- * Akhir pengobatan

4 Apa yang terjadi jika berhenti minum obat TB sebelum waktunya

Penyakit TB tidak sembuh dan dapat terus menular ke orang lain.

Kuman TB dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat sehingga pengobatan berikutnya akan lebih lama dan lebih mahal karena jenis obatnya berbeda.

Kuman TB yang kebal obat juga dapat ditularkan kepada orang lain