

ANTIBIOTIKA VS OBAT LAIN

Obat Maag (Radang Lambung)

Obat yang mengandung aluminium hidroksida ($\text{Al}(\text{OH})_3$) magnesium hidroksida ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) atau sukralat dapat menurunkan efektivitas antibiotika levofloxacin dan azitromycin sehingga dianjurkan untuk pemberian masing-masing obat.

OBAT RADANG


Obat seperti deksametason dan methylprednisolone jika diberikan bersama antibiotika ciprofloxacin / levofloxacin dapat meningkatkan potensi efek samping antibiotika yaitu radang pada otot/nyeri otot terutama pada orang tua

AYO CEGAH INTERAKSI OBAT !!

- Komunikasikanlah kepada dokter maupun apoteker anda jika menggunakan obat bersama dengan obat lain ataupun obat vitamin, suplemen dan obat herbal
- Pastikan dokter mengetahui obat-obatan yang rutin anda gunakan untuk mencegah terjadinya interaksi obat.
- Ikuti aturan minum sesuai informasi yang diberikan seperti konsumsi makanan atau minuman tertentu saat mengkonsumsi obat tersebut
- Hindari menggunakan obat yang diresepkan orang lain.
- Hindari penggunaan obat herbal dengan obat lain karena interaksinya belum diketahui

KENALI INTERAKSI PENGUNAAN ANTIBIOTIKA DENGAN MAKANAN DAN OBAT-OBATAN LAIN

INTERAKSI OBAT ANTIBIOTIKA



RUMAH SAKIT OTAK
DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
 Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi
 Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431
 Email : rsomh.bkt20@gmail.com




APA ITU ANTIBIOTIKA?

Obat yang digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan bakteri dan bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri.

CARA PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA YANG TEPAT?

- Gunakan antibiotika jika hanya diresepkan dokter
- Minum sampai habis antibiotika yang diberikan, meskipun merasa sudah sembuh
- Jangan menggunakan antibiotika untuk mengobati infeksi virus seperti batuk dan pilek, karena antibiotika untuk membunuh bakteri

INTERAKSI OBAT



Apa yang kita konsumsi (makanan, minuman, ataupun obat herbal dan obat lainnya) dapat mempengaruhi efektivitas suatu pengobatan

Hal yang dapat terjadi Akibat Interaksi Obat :

- Menurunkan efektivitas obat yang sedang kita konsumsi
- Meningkatkan efektivitas obat yang sedang kita konsumsi
- Meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping obat
- Menimbulkan efek yang tidak terduga dari konsumsi obat tersebut

ANTIBIOTIKA VS MAKANAN

Produk Olahan Susu dan Jus Jeruk

Golongan Quinolon (Ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin); serta Golongan Tetracycline (Doxycycline dan Tetracycline) dapat menurunkan efektivitasnya, jika dikonsumsi bersama dengan jus jeruk atau produk olahan susu seperti keju, susu, yogurt. Dianjurkan tidak mengonsumsi makanan tersebut bersamaan dengan obat di atas.

Kafein

Ciprofloxacin dapat meningkatkan efek kafein, sehingga disarankan menurunkan konsumsi minuman berkafein seperti kopi saat mengonsumsi obat ini.

Alkohol

Menonsumsi alkohol bersama obat metronidazol dapat mengakibatkan efek pusing, mual muntah dan kram perut.

Makanan pada Umumnya

Levofloxacin dan ampicilin efeknya menurun karena makanan. Sebaiknya obat diminum satu jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan.